

Su guía sobre un medicamento diseñado para ayudar a prevenir el rechazo del trasplante de riñón

Dirija su futuro con



Hable con su médico acerca de ENVARSUS XR como una posible opción de tratamiento inmunodepresor.



Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de ENVARSUS XR?

ENVARSUS XR podría causar efectos secundarios graves, incluidos:

Aumento del riesgo de cáncer. Las personas que toman ENVARSUS XR tienen un mayor riesgo de padecer algún tipo de cáncer, incluido el cáncer de piel y de las glándulas linfáticas (linfoma).

Aumento del riesgo de infección. ENVARSUS XR es un medicamento que afecta su sistema inmunitario. ENVARSUS XR puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. Pueden producirse infecciones graves en personas que reciben ENVARSUS XR que pueden causar la muerte.

La Información importante de seguridad continúa en la siguiente página.

Consulte la guía del medicamento adjunta para obtener más información que debe conocer sobre ENVARSUS XR.

¿Qué es ENVARSUS XR?

ENVARSUS XR es un medicamento de venta con receta que se usa junto con otros medicamentos para ayudar a prevenir el rechazo de órganos en personas que se han sometido a un trasplante de riñón. ENVARSUS XR es una forma de tacrolimus. Los proveedores de atención médica han confiado en tacrolimus durante más de 25 años; es el medicamento antirrechazo más utilizado en los Estados Unidos. ENVARSUS XR es un **comprimido** de liberación prolongada y no son los mismos que los comprimidos de liberación prolongada de tacrolimus, las cápsulas de liberación inmediata de tacrolimus o el tacrolimus para suspensión oral. Por lo tanto, aunque conozca tacrolimus, es importante que lea y comprenda ENVARSUS XR y en qué se diferencia.

¿En qué se diferencia ENVARSUS XR?

Diseñado con una tecnología única, ENVARSUS XR proporciona a su cuerpo niveles estables y homogéneos de tacrolimus durante 24 horas con una dosis una vez al día. ENVARSUS XR también está diseñado para ayudar a mantener los niveles de tacrolimus en la zona objetivo para prevenir el rechazo.

ENVARSUS XR es un comprimido de liberación prolongada y no es lo mismo que las cápsulas de liberación prolongada de tacrolimus una vez al día (Astagraf XL[®]) o las cápsulas de liberación inmediata de tacrolimus dos veces al día (Prograf[®] o tacrolimus genérico).

Información importante de seguridad (continuación)

Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene síntomas de una infección como:

- fiebre
- tos o síntomas gripales
- zonas calientes, rojas o dolorosas de la piel
- sudores o escalofríos
- dolores musculares

¿Qué es ENVARSUS XR?

ENVARSUS XR es un medicamento de venta con receta que se usa junto con otros medicamentos para ayudar a prevenir el rechazo de órganos en personas que se han sometido a un trasplante de riñón.

La Información importante de seguridad continúa en la siguiente página.

2 Consulte la guía del medicamento adjunta para obtener más información que debe conocer sobre ENVARSUS XR.

Otras marcas de tacrolimus o tacrolimus genérico no pueden mezclarse con ENVARSUS XR. No existe un sustituto genérico de ENVARSUS XR, y la administración de dosis es diferente a la de otros productos con tacrolimus. Si le recetan ENVARSUS XR, asegúrese de que es el único medicamento con tacrolimus que está tomando.

Otros productos con tacrolimus (como Prograf[®]) con los que puede estar familiarizado se toman dos veces al día. **No** tome ENVARSUS XR más de una vez al día. Los comprimidos de liberación prolongada de ENVARSUS XR se diseñaron para actuar con una sola dosis durante todo el día (24 horas) en los pacientes con trasplante de riñón. **No** tome ninguna otra cápsula de tacrolimus mientras esté recibiendo ENVARSUS XR. Deseche de forma segura los medicamentos que no estén actualizados o que ya no sean necesarios.



Su dosis diaria total de ENVARSUS XR puede ser inferior a la dosis diaria total que estaba tomando de otro producto de tacrolimus. **No** cambie su dosis de ENVARSUS XR a menos que su proveedor de atención médica le indique que lo haga.

¿Cuántas personas han probado el tratamiento con ENVARSUS XR?

Se ha estudiado ENVARSUS XR en más de 1600 participantes en ensayos clínicos. Desde su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), los médicos de los centros de trasplante de riñón de todo Estados Unidos lo han estado recetando a sus pacientes de trasplante renal. De hecho, el 99 % de los centros de trasplante de riñón han utilizado el tratamiento con ENVARSUS XR.

Información importante de seguridad (continuación)

ENVARSUS XR es un comprimido de liberación prolongada y no son los mismos que los comprimidos de liberación prolongada de tacrolimus, las cápsulas de liberación inmediata de tacrolimus o el tacrolimus para suspensión oral. Su proveedor de atención médica debe decidir qué medicamento es adecuado para usted.

¿Quién no debe tomar ENVARSUS XR?

No tome ENVARSUS XR si es alérgico a tacrolimus o a cualquiera de los componentes de ENVARSUS XR.



¿Cómo tomo ENVARUSUS XR?

Tome ENVARUSUS XR exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. **No deje** de tomar o de cambiar la dosis de ENVARUSUS XR sin hablar con su proveedor de atención médica.



Tome ENVARUSUS XR una vez al día con líquido (preferiblemente agua) con el estómago vacío, al menos 1 hora antes de una comida o al menos 2 horas después de una comida, a la misma hora todos los días (preferiblemente por la mañana).

Trague los comprimidos de ENVARUSUS XR enteros. **No** mastique, divida, triture ni disuelva los comprimidos.



Evite lo siguiente mientras esté tomando ENVARUSUS XR:

- Vacunas vivas como la vacuna antigripal por la nariz, el sarampión, las paperas, la rubéola, la polio por vía oral, el BCG (vacuna antituberculosa), la fiebre amarilla, la varicela o la fiebre tifoidea.
- Exposición a la luz solar y a la luz UV, como camas de bronceado. Utilice ropa protectora y un protector solar.
- Comer toronja, beber jugo de toronja o beber alcohol.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar ENVARUSUS XR?

Antes de tomar ENVARUSUS XR, informe a su proveedor de atención médica si usted:

- planea recibir vacunas vivas. Pregunte a su proveedor de atención médica si no está seguro si su vacuna es una vacuna viva.
- tiene o ha tenido problemas hepáticos, renales o cardíacos.
- tiene cualquier otra afección médica.
- está embarazada o planea quedar embarazada. ENVARUSUS XR puede causarle daño al feto.

La Información importante de seguridad continúa en la siguiente página.

- 4 **Consulte la guía del medicamento adjunta para obtener más información que debe conocer sobre ENVARUSUS XR.**



¿Qué pasa si omito una dosis?

Tome una dosis omitida lo antes posible, pero **no más de 15 horas después de saltarse su dosis programada**. Si la hora a la que se omite la dosis excede las 15 horas, debe omitir la dosis y tomar la siguiente dosis a la mañana siguiente a la hora programada. **No** tome 2 dosis al mismo tiempo.

Si omite una dosis de ENVARUSUS XR, llame a su proveedor de atención médica lo antes posible.

¿Cómo debo conservar ENVARUSUS XR?

Conserve ENVARUSUS XR a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20° C y 25° C).

Información importante de seguridad (continuación)

- Si puede quedar embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz antes y durante el tratamiento con ENVARUSUS XR. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted.
- Los hombres que tengan parejas femeninas que puedan quedar embarazadas también deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces antes y durante el tratamiento con ENVARUSUS XR. Hable con su proveedor de atención médica antes de comenzar el tratamiento con ENVARUSUS XR sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted.

Una vez al día
Envarsus XR[®]
(tacrolimus extended-release tablets)
CONTROL CON CONFIANZA

Asegúrese de que su comprimido sea ENVARSUS XR

Otras marcas de tacrolimus o tacrolimus genérico **no pueden** utilizarse de forma intercambiable con ENVARSUS XR. No existe un sustituto genérico de ENVARSUS XR, y la administración de dosis es diferente a la de otros productos con tacrolimus.

Asegúrese de que su comprimido de ENVARSUS XR (otros productos de tacrolimus son cápsulas, no comprimidos) tiene el mismo aspecto que el de la imagen siguiente y tiene el número de concentración de dosis correcto (ara que coincida con su receta) en el lado de la dosis del comprimido y las letras "TCS" en el otro lado.



Cápsula de tacrolimus;
no de ENVARSUS XR

Si no está seguro de su comprimido, colóquelo en la imagen para compararlo.*



*Todos los comprimidos de ENVARSUS XR se muestran en tamaño real.

El frasco de comprimidos de la farmacia siempre debe decir ENVARSUS XR.

Si alguna de estas cosas no coincide, llame inmediatamente a su farmacéutico, proveedor de atención médica y/o coordinador de trasplantes.

Hay otras indicaciones importantes sobre la toma de ENVARSUS XR. Revise la **Guía del medicamento** completa.

Información importante de seguridad (continuación)

- Existe un registro de embarazos para mujeres que queden embarazadas y hombres que hayan engendrado un embarazo durante el tratamiento con ENVARSUS XR. El propósito de este registro es recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Para inscribirse en este registro voluntario, llame al 1-877-955-6877.
- Está amamantando o planea amamantar. ENVARSUS XR pasa a su leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si va a amamantar mientras toma ENVARSUS XR.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluso los de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

La Información importante de seguridad continúa en la siguiente página.

6 Consulte la guía del medicamento adjunta para obtener más información que debe conocer sobre ENVARSUS XR.

Otras indicaciones importantes

Se controlará su nivel de ENVARSUS XR en sangre y se podrá ajustar su dosis. Si se ajusta su dosis, asegúrese de seguir cuidadosamente las indicaciones de administración de la dosis de su proveedor de atención médica.

Si su farmacéutico le ofrece sustituirlo por otra marca de tacrolimus o tacrolimus genérico, llame inmediatamente a su proveedor de atención médica y/o coordinador de trasplantes.

Si tiene una cita con su médico de cabecera o con un proveedor de atención médica fuera del centro de trasplantes, dígame que está tomando ENVARSUS XR y que no es intercambiable con otros productos de tacrolimus.

Informe a su proveedor de atención médica si experimenta algún efecto secundario que le resulte molesto o que no desaparezca. Los efectos secundarios que se enumeran en esta guía no son todos los posibles efectos secundarios de ENVARSUS XR. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención de la salud o farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoría médica acerca de los efectos secundarios.

Para notificar efectos secundarios, póngase en contacto con Veloxis Pharmaceuticals, Inc. al 1-844-VELOXIS (835-6947) o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Información importante de seguridad (continuación)

ENVARSUS XR puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar el funcionamiento de ENVARSUS XR.

¿Cómo debo tomar ENVARSUS XR?

Tome ENVARSUS XR exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis de ENVARSUS XR si es necesario. **No** deje de tomar o de cambiar la dosis de ENVARSUS XR sin hablar con su proveedor de atención médica.

Tome ENVARSUS XR una vez al día con líquido (preferiblemente agua) con el estómago vacío, al menos 1 hora antes o al menos 2 horas después de una comida, a la misma hora cada día (preferiblemente por la mañana).



¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENVARSUS XR?

ENVARSUS XR podría causar efectos secundarios graves, incluidos:

Aumento del riesgo de cáncer. Las personas que toman ENVARSUS XR tienen un mayor riesgo de padecer algún tipo de cáncer, incluido el cáncer de piel y de las glándulas linfáticas (linfoma).

Aumento del riesgo de infección. ENVARSUS XR es un medicamento que afecta su sistema inmunitario. ENVARSUS XR puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. Pueden producirse infecciones graves en personas que reciben ENVARSUS XR que pueden causar la muerte.

Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene síntomas de una infección como:

- fiebre
- sudores o escalofríos
- dolores musculares
- zonas calientes, rojas o dolorosas de la piel
- síntomas similares a la tos o la gripe

Nivel alto de azúcar en sangre (diabetes). Su proveedor de atención médica puede realizarle ciertas pruebas para comprobar si tiene diabetes mientras toma ENVARSUS XR.

Problemas renales. Los problemas renales son efectos secundarios graves y frecuentes de la administración de ENVARSUS XR. Su proveedor de atención médica puede realizarle ciertas pruebas para comprobar la función renal mientras toma ENVARSUS XR.

Los efectos secundarios más frecuentes de ENVARSUS XR incluyen, diarrea, infección urinaria, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), presión arterial alta y estreñimiento.

Información importante de seguridad (continuación)

Tome los comprimidos de ENVARSUS XR enteros. **No** mastique, divida, triture ni disuelva los comprimidos de ENVARSUS XR antes de tragarlos. Si no puede tragar los comprimidos de ENVARSUS XR enteros, informe a su proveedor de atención médica.

Si omite su dosis de ENVARSUS XR, debe tomarla lo antes posible, pero no más de 15 horas después de omitir su dosis. Si la hora a la que se omite la dosis excede las 15 horas, debe omitir la dosis omitida y tomar la siguiente dosis a la mañana siguiente a la hora programada. **No** tome 2 dosis al mismo tiempo.

Si usted toma demasiado ENVARSUS XR, llame a su proveedor de atención médica o acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.

La Información importante de seguridad continúa en la siguiente página.

8 **Consulte la guía del medicamento adjunta para obtener más información que debe conocer sobre ENVARSUS XR.**

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de ENVARSUS XR?

ENVARSUS XR podría causar efectos secundarios graves, incluidos:

Aumento del riesgo de cáncer. Las personas que toman ENVARSUS XR tienen un mayor riesgo de padecer algún tipo de cáncer, incluido el cáncer de piel y de las glándulas linfáticas (linfoma).

Aumento del riesgo de infección. ENVARSUS XR es un medicamento que afecta su sistema inmunitario. ENVARSUS XR puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. Pueden producirse infecciones graves en personas que reciben ENVARSUS XR que pueden causar la muerte.

Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si tiene síntomas de una infección como:

- fiebre
- sudores o escalofríos
- tos o síntomas gripales
- dolores musculares
- zonas calientes, rojas o dolorosas de la piel

¿Qué es ENVARSUS XR?

ENVARSUS XR es un medicamento de venta con receta que se usa junto con otros medicamentos para ayudar a prevenir el rechazo de órganos en personas que se han sometido a un trasplante de riñón.

ENVARSUS XR es un comprimido de liberación prolongada y no son los mismos que los comprimidos de liberación prolongada de tacrolimus, las cápsulas de liberación inmediata de tacrolimus o el tacrolimus para suspensión oral. Su proveedor de atención médica debe decidir qué medicamento es adecuado para usted.

¿Quién no debe tomar ENVARSUS XR?

No tome ENVARSUS XR si es alérgico a tacrolimus o a cualquiera de los componentes de ENVARSUS XR.

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar ENVARSUS XR?

Antes de tomar ENVARSUS XR, informe a su proveedor de atención médica si usted:

- planea recibir vacunas vivas. Pregunte a su proveedor de atención médica si no está seguro si su vacuna es una vacuna viva.
- tiene o ha tenido problemas hepáticos, renales o cardíacos.
- tiene cualquier otra afección médica.
- está embarazada o planea quedar embarazada. ENVARSUS XR puede causarle daño al feto.

Una vez al día
Envarsus XR[®]
(tacrolimus extended-release tablets)
CONTROL CON CONFIANZA

Información importante de seguridad (continuación)

- Si puede quedar embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz antes y durante el tratamiento con ENVARSUS XR. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted.
- Los hombres que tengan parejas femeninas que puedan quedar embarazadas también deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces antes y durante el tratamiento con ENVARSUS XR. Hable con su proveedor de atención médica antes de comenzar el tratamiento con ENVARSUS XR sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted.
- Existe un registro de embarazos para mujeres que queden embarazadas y hombres que hayan engendrado un embarazo durante el tratamiento con ENVARSUS XR. El propósito de este registro es recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Para inscribirse en este registro voluntario, llame al 1-877-955-6877.

• Está amamantando o planea amamantar. ENVARSUS XR pasa a su leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si va a amamantar mientras toma ENVARSUS XR.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluso los de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

ENVARSUS XR puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar el funcionamiento de ENVARSUS XR.

¿Cómo debo tomar ENVARSUS XR?

Tome ENVARSUS XR exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis de ENVARSUS XR si es necesario. **No** deje de tomar o de cambiar la dosis de ENVARSUS XR sin hablar con su proveedor de atención médica.

Tome ENVARSUS XR una vez al día con líquido (preferiblemente agua) con el estómago vacío, al menos 1 hora antes o al menos 2 horas después de una comida, a la misma hora cada día (preferiblemente por la mañana).

Tome los comprimidos de ENVARSUS XR enteros. **No** mastique, divida, triture ni disuelva los comprimidos de ENVARSUS XR antes de tragarlos. Si no puede tragar los comprimidos de ENVARSUS XR enteros, informe a su proveedor de atención médica.

Si omite su dosis de ENVARSUS XR, debe tomarla lo antes posible, pero no más de 15 horas después de omitir su dosis. Si la hora a la que se omite la dosis excede las 15 horas, debe omitir la dosis omitida y tomar la siguiente dosis a la mañana siguiente a la hora programada. **No** tome 2 dosis al mismo tiempo.

Si usted toma demasiado ENVARSUS XR, llame a su proveedor de atención médica o acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.

La Información importante de seguridad continúa en la siguiente página.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Qué debo evitar mientras tomo ENVARSUS XR?

Vacunas vivas como la vacuna antigripal por la nariz, el sarampión, las paperas, la rubéola, la polio por vía oral, el BCG (vacuna antituberculosa), la fiebre amarilla, la varicela o la fiebre tifoidea.

Exposición a la luz solar y a la luz UV, como camas de bronceado. Utilice ropa protectora y un protector solar.

No debe comer toronja ni beber jugo de toronja mientras esté tomando ENVARSUS XR.

No debe beber alcohol mientras esté tomando ENVARSUS XR.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENVARSUS XR?

ENVARSUS XR pueden causar efectos secundarios graves, incluidos:

Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de ENVARSUS XR?”.

Problemas de errores de medicamento como el rechazo del injerto y otras reacciones graves. Personas que han tomado ENVARSUS XR, en ocasiones han tomado el medicamento incorrecto porque algunos medicamentos tienen el mismo ingrediente (tacrolimus) que ENVARSUS XR. **Compruebe su ENVARSUS XR cuando reciba una nueva receta para asegurarse de que ha recibido el medicamento adecuado.**

- Llame a su proveedor de atención médica inmediatamente si cree que se le ha administrado el medicamento equivocado.
- Pregunte a su proveedor de atención médica o farmacia si no está seguro del aspecto que debería tener ENVARSUS XR.

Nivel alto de azúcar en sangre (diabetes). Su proveedor de atención médica puede realizarle ciertas pruebas para comprobar si tiene diabetes mientras toma ENVARSUS XR. Llame a su proveedor de atención médica en los siguientes casos:

- micción frecuente
- somnolencia
- confusión
- náuseas, vómitos o dolor de estómago
- olor afrutado en la aliento
- visión borrosa
- aumento de la sed
- pérdida de apetito o del hambre

Problemas renales. Los problemas renales son efectos secundarios graves y frecuentes de la administración de ENVARSUS XR. Su proveedor de atención médica puede realizarle ciertas pruebas para comprobar la función renal mientras toma ENVARSUS XR.

Problemas del sistema nervioso. Los problemas en el sistema nervioso son un efecto secundario grave y frecuente de ENVARSUS XR. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta alguno de estos síntomas mientras toma ENVARSUS XR. Estos podrían ser señales de

Información importante de seguridad (continuación)

problemas graves del sistema nervioso:

- confusión
- entumecimiento y hormigueo
- cambios en la visión
- coma
- dolor de cabeza
- temblores musculares
- convulsiones

Niveles altos de potasio en la sangre. Su proveedor de atención médica puede realizarle algunas pruebas para comprobar su nivel de potasio mientras toma ENVARSUS XR.

Presión arterial alta. Su proveedor de atención médica vigilará su presión arterial mientras toma ENVARSUS XR.

Cambios en la actividad eléctrica del corazón (prolongación del intervalo QT).

Recuento bajo de células sanguíneas grave (anemia).

Los efectos secundarios más frecuentes de ENVARSUS XR son diarrea, infección urinaria, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), presión arterial alta y estreñimiento.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ENVARSUS XR. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico.

Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoría médica acerca de los efectos secundarios. Puede informar efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo conservar ENVARSUS XR?

Conserve ENVARSUS XR a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20° C y 25° C).

Deseche de forma segura los medicamentos que no estén actualizados o que ya no sean necesarios.

Mantenga ENVARSUS XR y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general acerca del uso seguro y eficaz de ENVARSUS XR.

A veces los medicamentos se recetan con propósitos distintos de los enumerados en la Guía del medicamento. No use ENVARSUS XR para tratar afecciones para las que no fue recetado. No administre ENVARSUS XR a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Hacer esto podría causarles daño.

Esta Guía del medicamento resume la información más importante acerca de ENVARSUS XR. Si desea obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica. Puede pedirle a su proveedor de atención médica o a su farmacia información redactada para profesionales de atención médica sobre ENVARSUS XR. Para obtener más información, visite www.ENVARSUSXR.com o llame al 1-844-Veloxis (1-844-835-6947).

Se le recomienda informar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

Nuestro compromiso de ayudar a los pacientes con trasplante de riñón

Veloxis se dedica a garantizar que los pacientes, independientemente de su situación, reciban su medicamento. Tanto si tiene un seguro comercial o del gobierno, como si no tiene seguro o tiene un seguro insuficiente, disponemos de ayudas económicas específicas para los pacientes que toman ENVARSUS XR.*

Pague tan poco como \$0*.[†]

Ahorro de bolsillo para los pacientes con seguro comercial elegibles

Programa de asistencia al paciente*

Proporciona medicamentos gratuitos a los pacientes elegibles

Para obtener más información sobre el ahorro y la asistencia, visite www.ENVARSUSXR.com

*Sujeto a los términos, condiciones y requisitos de elegibilidad.

[†]Los pacientes asegurados elegibles pueden ahorrar hasta un beneficio máximo de \$8,550 al año del copago del paciente o de los gastos de bolsillo de ENVARSUS XR. El paciente es responsable de cualquier diferencial superior a \$8,550. La oferta no es válida para pacientes que pagan en efectivo o cuando el medicamento no está cubierto por el seguro primario. Esta oferta es válida en los Estados Unidos. No se permiten sustituciones. Los pacientes con seguro del gobierno no son elegibles para recibir asistencia proporcionada en el Programa de copago, incluidos, entre otros, pacientes con Medicare, Medicaid, Medigap, TriCare, VA, DoD o cualquier otro programa de atención de la salud federal, estatal o público financiado. Los pacientes sin seguro y que pagan en efectivo no son elegibles para el Programa de copago, ni tampoco las personas con seguro comercial que no tengan cobertura para ENVARSUS XR.

La asistencia financiera del Programa de copago solo está disponible para pacientes a los que se les haya recetado ENVARSUS XR para una indicación aprobada por la FDA.

Apoyo personalizado después del trasplante

Veloxis Transplant Support ofrece apoyo especializado de especialistas que pueden confirmar la cobertura e identificar opciones de asistencia financiera. El especialista es su único punto de contacto, que puede ayudarlo con:

Investigación de beneficios

Verificación de la cobertura, identificación de posibles restricciones y aclaración de gastos de bolsillo y cobertura del seguro

Asistencia para autorizaciones previas

Lo guía a través de cada paso del proceso de su aseguradora, incluida la identificación de los requisitos de autorización previa

Investigación sobre financiación alternativa

Identificación de fundaciones independientes que puedan ayudar a pacientes con seguro insuficiente o sin seguro.

Coordinación con farmacias especializadas

Garantizar el acceso a ENVARSUS XR® (comprimidos de liberación prolongada de tacrolimus) antes de surtir la receta

Veloxis | Transplant Support

1-844-VELOXIS (835-6947)

Monday–Friday, 9 AM–7 PM ET

[VeloxisTransplantSupport.com](https://www.VeloxisTransplantSupport.com)

Veloxis se dedica a garantizar que todos los pacientes, independientemente de su situación, reciban su medicamento.

www.ENVARSUSXR.com

Consulte la guía del medicamento adjunta para obtener más información que debe conocer sobre ENVARSUS XR.



©2023 Veloxis Pharmaceuticals, Inc. US-ENV-2200060 10/23

ENVARSUS XR es una marca comercial registrada de Veloxis Pharmaceuticals, Inc.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.